herpy

GECKOS

Morocco lizard-fingered gecko

Saurodactylus brosseti

Saurodactylus brosseti es un gecko terrestre muy pequeño del oeste de Marruecos. El cuerpo mide unos 3 cm del hocico a la cloaca, y la especie es activa durante el día y al crepúsculo. Se trata de un complejo de especies crípticas y es casi desconocida en cautividad, por lo que esta guía se basa en el clima de su área de distribución.

Familia: Sphaerodactylidae Nombre anterior: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día y al crepúsculo**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-28 °C**
Punto caliente	**30-32 °C**
Temperatura, noche	**12-18 °C**
Humedad	**40-60 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1 huevos**
Incubación	**60-90 días** a 24-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Casi no existen conocimientos sobre el mantenimiento de *Saurodactylus brosseti*.
TEMPERATURA	Durante el día, el suelo se mantiene a 22-28 °C, con un pequeño punto de calor de 30-32 °C bajo un foco débil controlado por un termostato. Por la noche, la temperatura baja a 12-18 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad del aire debe ser del 40-60 %. Pulveriza el terrario ligeramente cada dos o tres días, de modo que queden gotas en las piedras y las hojas para que el animal beba, y deja que se seque entre una pulverización y otra.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Saurodactylus brosseti* es activo durante el día y al crepúsculo.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, la especie se alimenta de pequeños artrópodos. Los insectos deben ser muy pequeños, no mayores que la cabeza del animal: colémbolos, moscas de la fruta, grillos recién nacidos y pequeñas cochinillas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie caza al acecho: permanece quieta y ataca cuando pasa un pequeño insecto. No se ha documentado su comportamiento en cautividad. Mantén el animal solo o en pareja en un terrario espacioso con muchos refugios.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Marruecos.