herpy

GECKOS

Ashy gecko

Sphaerodactylus elegans

Una de las especies más grandes entre los geckos enanos, aunque mide solo 7-8 cm. *Sphaerodactylus elegans* es diurno, trepa por el cristal y cambia de aspecto a lo largo de su vida: las crías tienen bandas transversales negras sobre un cuerpo amarillo y la cola naranja, mientras que los adultos son de un marrón rojizo apagado con un fino dibujo de puntos claros.

Familia: Sphaerodactylidae Nombre anterior: *Sphaerodactylus alopex; Sphaerodactylus punctatissimus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7-8 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-28 °C**
Punto caliente	**29-32 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**60-70 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1 huevos**
Incubación	**80-90 días** a 24-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja necesita un terrario de al menos 30 × 30 × 30 cm (largo × ancho × alto).
TEMPERATURA	De día debe haber 24-28 °C, con una pequeña zona de calor de 29-32 °C bajo una bombilla de baja potencia con termostato. El lado frío no debe superar los 28 °C, así que elige una fuente de calor de poca potencia.
HUMEDAD Y AGUA	La especie necesita más humedad que muchos otros geckos enanos. La humedad ambiental debe rondar el 60-70 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	El gecko es diurno y se beneficia de mucha luz. Mantén la luz encendida unas 12 horas al día, algo menos en invierno. Si hay plantas vivas, también hace falta una lámpara LED para plantas.
ALIMENTACIÓN	El gecko es insectívoro. Animales pequeños significan presas pequeñas: las crías deben recibir grillos recién nacidos, moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster*), colémbolos y pequeños isópodos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Lo mejor es mantener la especie en solitario o en pareja. Los machos nunca deben alojarse juntos, porque pelean.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Cuba, Haití y República Dominicana.