herpy

GECKOS

Middle Eastern short-fingered gecko

Stenodactylus doriae

Una de las especies más grandes del género *Stenodactylus*: un gecko esbelto, nocturno y terrestre, de patas largas y dedos franjeados, que se entierra en la arena durante el día. Se sabe poco sobre su mantenimiento, pero puede mantenerse como sus parientes más cercanos en un terrario seco con sustrato arenoso.

Familia: Gekkonidae Nombre anterior: *Ceramodactylus doriae; Ceramodactylus major; Stenodactylus major*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**5-8 cm** longitud hocico-cloaca
Peso	**5-11 g**
Esperanza de vida	**9-10 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 20 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**35-38 °C**
Temperatura, noche	**18-24 °C**
Humedad	**40-60 %**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**8 meses**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**60-80 días** a 27-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Stenodactylus doriae*. La instalación sigue la de sus parientes más cercanos, *Stenodactylus petrii* y *Stenodactylus sthenodactylus*, procedentes de los mismos desiertos.
TEMPERATURA	Durante el día debe haber 24-29 °C en el terrario y 35-38 °C en el punto más caliente, por ejemplo sobre una manta térmica o un cable calefactor bajo el fondo, o bajo una lámpara en un extremo.
HUMEDAD Y AGUA	El aire debe tener una humedad entre baja y moderada, de alrededor del 40-60 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es nocturna y puede vivir sin UVB si recibe calcio con vitamina D3 a través del alimento. Una luz UVB débil sobre una parte del terrario es opcional, siempre que los animales puedan enterrarse a la sombra.
ALIMENTACIÓN	La base de la alimentación son insectos vivos, sobre todo grillos, complementados con larvas de polilla de la cera, gusanos de la harina, minigusanos de la harina y moscas de la fruta no voladoras.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Stenodactylus doriae* no es un animal para manipular. Es rápido y frágil, y puede perder la cola. Los animales salen al caer la noche y pasan el día en sus galerías. Los machos pueden emitir sonidos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Arabia Saudí, Catar, Irán, Irak, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania y Kuwait.