herpy

GECKOS

Turnip-tailed gecko

Thecadactylus rapicauda

Uno de los geckos más grandes de América: un cazador al acecho nocturno sin párpados móviles, con pupilas verticales, lengua azul y una cola que, tras perderla, vuelve a crecer gruesa como un nabo. La especie se distribuye desde México hasta Brasil, pero es rara en terrarios y existen muy pocos datos fiables sobre su mantenimiento.

Familia: Phyllodactylidae Nombre anterior: *Gekko rapicauda; Gekko laevis; Platydactylus theconyx*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**9-13 cm** longitud hocico-cloaca
Peso	**16-40 g**
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque seco y selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 90 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**25-28 °C**
Punto caliente	**30-31 °C**
Temperatura, noche	**21-24 °C**
Humedad	**60-80 %**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**150-200 días** a 24-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
Un solo ejemplar necesita un terrario de al menos 60 × 45 × 90 cm (largo × ancho × alto), y una pareja, de al menos 70 × 70 × 90 cm.

TEMPERATURA
La especie está activa dentro de un rango de temperatura relativamente estrecho. De día debe haber 25-28 °C, con una zona algo más cálida de 30-31 °C en la parte alta del terrario, y de noche 21-24 °C.

HUMEDAD Y AGUA
La especie necesita una humedad ambiental alta. Mantenla en 60-80 %: la humedad sube tras una pulverización por la tarde y baja a lo largo del día.

ILUMINACIÓN Y UVB
La especie es nocturna y se esconde de día en grietas oscuras, así que no es necesario UVB si el alimento se suplementa con calcio y vitamina D3.

ALIMENTACIÓN
En la naturaleza, la especie es un cazador al acecho con una dieta muy amplia.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El animal es lento y tranquilo cuando no está amenazado, pero puede ser ágil y agresivo cuando se le molesta. Puede morder con fuerza y desprende la cola con una presión mínima.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, Caribe neerlandés, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada.