herpy

GECKOS

## Common flat-tail gecko

# *Uroplatus fimbriatus*

El clásico del género y uno de los geckos de cola plana más grandes: un animal nocturno con flecos y del color de la corteza, procedente de las selvas del este de Madagascar, que durante el día se funde con el tronco. Es impresionante de ver, pero necesita temperaturas frescas, mucha humedad y un cuidador paciente y con experiencia.

Familia: Gekkonidae  Nombre anterior: *Stellio fimbriatus*

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **25-33 cm**<br>longitud total con la cola |
| Esperanza de vida | **7-10 años** |
| Activo | **Al crepúsculo y de noche** |
| Modo de vida | **Arborícola** |
| Hábitat | **Selva tropical** |
| Dificultad | **Avanzado** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **60 × 60 × 100 cm**<br>L × An × Al para 2 adultos |
| Temperatura, día | **22-25 °C** |
| Temperatura, noche | **17-21 °C** |
| Humedad | **65-95 %** |
| UVB | **Recomendado**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentación | **Insectos** |
| Se mantiene | **En solitario, en pareja o un macho con varias hembras** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Tamaño de la puesta | **1-2 huevos** |
| Incubación | **100-230 días**<br>a 18-26 °C |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **Apéndice II** |
| Anexo de la UE | **Anexo B** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | La especie aprovecha la altura, así que el terrario debe ser alto. |
| **TEMPERATURA** | La especie tolera mal el calor y debe mantenerse más fresca de lo que mucha gente cree. De día son adecuados 22-25 °C, y de noche la temperatura debe bajar a 17-21 °C. El descenso nocturno es una parte importante del ritmo diario. |
| **HUMEDAD Y AGUA** | La humedad alta es lo más importante en el cuidado, porque la especie se deshidrata con facilidad. Mantén la humedad en 65-70 % de día y 80-95 % de noche, y deja que el sustrato se seque un poco durante el día. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | La especie es activa al anochecer y por la noche, y pertenece a la zona 1 de Ferguson junto con otros animales de sombra. Se recomienda una luz UVB suave para todo el género. |
| **ALIMENTACIÓN** | La especie come insectos y casi solo acepta presas vivas. Ofrece una mezcla de grillos, saltamontes, cucarachas dubia y tenebrios grandes, y larvas de polilla de la cera como premio. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | El gecko apuesta por el camuflaje antes que por la huida y es tímido y sensible al estrés. Los animales capturados en la naturaleza saltan y pueden morder cuando se los toca. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Madagascar. |

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/geckos/uroplatus-fimbriatus