herpy

IGUANAS

Anolis verde

Anolis carolinensis

Anolis carolinensis es un lagarto esbelto y trepador del sureste de Estados Unidos que cambia entre verde y marrón según la temperatura, la luz y su estado de ánimo. Alcanza 12-20 cm incluida la cola, es diurno y se alimenta de pequeños insectos. Necesita un terrario alto, luminoso y húmedo con UVB y una zona de sol caliente, y el macho se mantiene solo o con un par de hembras.

Familia: Dactyloidae Nombre en inglés: Green Anole Nombre anterior: *Ameiua bullaris; Anolis baccatus; Anolis podargicus; Anolius carolinensis; Norops baccatus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**12-20 cm** longitud total con la cola
Peso	**2-6 g**
Esperanza de vida	**4-8 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-28 °C**
Punto caliente	**30-35 °C**
Temperatura, noche	**18-24 °C**
Humedad	**60-70 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**4-12 meses**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Puestas por año	**6-10**
Incubación	**35-49 días** a 28-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un solo anolis necesita un terrario de al menos 60 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto). Cuanto mayor, mejor, sobre todo en altura, porque la especie trepa y aprovecha todo el espacio.
TEMPERATURA	La zona de sol debe estar a 30-35 °C medidos en la rama justo debajo de la lámpara de calor. El resto del terrario se mantiene a 22-28 °C durante el día, y por la noche son adecuados 18-24 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe estar en un 60-70 % de media, más baja a mediodía y más alta por la noche. Pulveriza las plantas por la mañana y por la tarde, para que el animal pueda beber las gotas de las hojas.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita luz intensa y UVB todos los días. Toma el sol en semisombra, y la lámpara UVB debe dar la zona 2 de Ferguson, es decir, un índice UV de como máximo unos 3 en la zona de sol.
ALIMENTACIÓN	*Anolis carolinensis* es insectívoro y captura presas vivas que se mueven.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los machos son territoriales y se exhiben moviendo la cabeza arriba y abajo, desplegando la papada e hinchándose. Dos machos en el mismo terrario pelean, y el más débil resulta herido o sucumbe al estrés.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos.