herpy

IGUANAS

Texas horned lizard

Phrynosoma cornutum

Phrynosoma cornutum es un lagarto ancho y aplanado, con cuernos en la cabeza y dos hileras de escamas puntiagudas a lo largo de los costados. Vive en pastizales abiertos y secos y en matorrales del sur de Estados Unidos y el norte de México. Mide 7-13 cm de hocico a cloaca, es diurno y se alimenta sobre todo de hormigas. La alimentación es precisamente el gran obstáculo: es difícil de sustituir, y la especie es uno de los lagartos más difíciles de mantener en terrario.

Familia: Phrynosomatidae Nombre anterior: *Agama cornuta; Phrynosoma brevicornis; Phrynosoma bufonium; Phrynosoma harlanii; Phrynosoma planiceps*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7-13 cm** longitud hocico-cloaca
Peso	**25-90 g**
Esperanza de vida	**7-9 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto y sabana**
Dificultad	**Experto**

CUIDADOS

Terrario mín.	**100 × 50 × 40 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-29 °C**
Punto caliente	**38-42 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**20-40 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**24 meses**
Tamaño de la puesta	**14-37 huevos**
Puestas por año	**1**
Incubación	**40-61 días** a 27-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Phrynosoma cornutum*. Por ello, los cuidados se basan en su hábitat: terreno abierto y seco, tierra suelta, sol intenso y una dieta de hormigas.
TEMPERATURA	La especie es amante del sol y necesita una zona de calentamiento donde la superficie alcance 38-42 °C, medida con un termómetro infrarrojo.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser baja, 20-40 %, y el terrario debe secarse por completo a lo largo del día. El sustrato no debe estar mojado.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y pasa el día a pleno sol, por lo que necesita luz intensa y UVB durante todo el año.
ALIMENTACIÓN	La alimentación es la limitación decisiva. En la naturaleza, alrededor del 70 % de la dieta son hormigas cosechadoras (*Pogonomyrmex*), y las crías solo comen hormigas pequeñas. El resto son termitas, escarabajos y saltamontes.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Phrynosoma cornutum* es tranquilo y silencioso, y vive en solitario. Llama poco la atención y es fácil pasarlo por alto, porque se confunde con el sustrato.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos y México.