herpy

IGUANAS

Emerald Swift

Sceloporus malachiticus

Sceloporus malachiticus es un lagarto pequeño y ágil de los frescos bosques de montaña de Centroamérica. El macho es de color verde esmeralda con manchas azules en el vientre, mientras que la hembra es parda con manchas oscuras. Es una especie diurna, se alimenta de insectos y tanto trepa como corre por el suelo. Necesita un terrario bien iluminado con UVB, una zona de calor para tomar el sol, aire húmedo y noches más frescas. Es vivípara y resulta difícil de aclimatar.

Familia: Phrynosomatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-25 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**3-5 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola, rupícola y terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña y terreno rocoso**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**33-37 °C**
Temperatura, noche	**16-20 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**12-18 meses**
Tamaño de la camada	**2-10 crías**
Gestación	**90-120 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Se sabe poco sobre el cuidado de *Sceloporus malachiticus*, y lo que se sabe se basa en gran medida en el clima de los bosques de montaña. Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 90 × 45 × 60 cm (largo × ancho × alto).

TEMPERATURA

Sceloporus malachiticus procede de altitudes más frescas y no necesita las altas temperaturas que requieren las especies desérticas del género. El aire debe estar a 24-29 °C durante el día.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe ser del 60-80 %. Pulveriza las plantas y la decoración por la mañana y por la tarde para que haya gotas que beber, y mantén el sustrato húmedo pero no empapado.

ILUMINACIÓN Y UVB

Sceloporus malachiticus es diurna y toma el sol hacia el mediodía, por lo que necesita UVB. Usa un tubo T5 HO (zona 3 de Ferguson) con reflector sobre la zona de sol.

ALIMENTACIÓN

La especie es insectívora, pero también come algo de hojas. Ofrece insectos vivos: grillos, cucarachas, saltamontes pequeños, gusanos de la harina, gusanos de seda y larvas de mosca soldado, no más grandes que la cabeza del animal.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Es un animal tímido y ágil que tolera mal la manipulación, así que esta debe reducirse al mínimo. No lo agarres nunca por la cola, porque puede desprenderse. Los machos son territoriales y no deben convivir.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.