herpy

IGUANAS

Western fence lizard

Sceloporus occidentalis

Sceloporus occidentalis es un lagarto pequeño, rápido y de escamas rugosas del oeste de Estados Unidos, que se posa al pleno sol sobre piedras, troncos y vallas. El macho tiene manchas azules en el vientre y la garganta, que exhibe con flexiones. La especie alcanza unos 21 cm, es diurna y se alimenta de insectos. Necesita una zona de solario potente, UVB, un terrario amplio y una tapa bien ajustada.

Familia: Phrynosomatidae Nombre anterior: *Sceloporus longipes; Sceloporus smaragdinus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**14-23 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**4-5 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola, rupícola y terrestre**
Hábitat	**Terreno rocoso y bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**80 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-28 °C**
Punto caliente	**38-42 °C**
Temperatura, noche	**18-24 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Reposo invernal	**8-12 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**12-24 meses**
Tamaño de la puesta	**3-17 huevos**
Puestas por año	**1-3**
Incubación	**55-65 días** a 27-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado específico de *Sceloporus occidentalis*, así que el manejo se basa en las necesidades que comparten las especies pequeñas y amantes del sol del género.
TEMPERATURA	Durante el día la temperatura debe ser de 27-28 °C. Justo bajo una lámpara de calor debe haber una zona de solario de 38-42 °C, medida en la superficie con un termómetro infrarrojo.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser moderada, de alrededor del 30-50 %. La especie vive en zonas abiertas y soleadas y no tolera una humedad vaporosa permanente, pero el sustrato tampoco debe estar completamente seco.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Sceloporus occidentalis* es diurna y amante del sol, y necesita luz intensa y UVB durante todo el año. Usa un tubo UVB (zona 3 de Ferguson) o una lámpara combinada de vapor metálico con UVB sobre la zona de solario.
ALIMENTACIÓN	*Sceloporus occidentalis* es insectívora. En la naturaleza come grillos, arañas, garrapatas, escorpiones, hormigas y escarabajos, y de vez en cuando captura un lagarto más pequeño.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Sceloporus occidentalis* es recelosa, rápida y territorial. Los machos se exhiben con flexiones, cabeceos y el cuerpo hinchado. La especie no se amansa y no es adecuada para manipularla.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Estados Unidos y México.