herpy

LACÉRTIDOS

Lagarto ágil

Lacerta agilis

Lacerta agilis es un lagarto robusto, de patas cortas y de actividad diurna, propio de brezales arenosos, dunas y taludes soleados. La especie vive desde el sur de Inglaterra hasta el lago Baikal, y el macho muestra flancos de un verde brillante en la época de celo. Alcanza unos 20 cm, se alimenta de insectos y necesita sol, un reposo invernal frío y, a ser posible, un recinto exterior.

Familia: Lacertidae Nombre en inglés: Sand Lizard

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-25 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**6-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-30 °C**
Punto caliente	**38-45 °C**
Temperatura, noche	**12-17 °C**
Humedad	**40-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Reposo invernal	**4-6 °C** 4-16 semanas
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**24-36 meses**
Tamaño de la puesta	**4-15 huevos**
Puestas por año	**1-2**
Incubación	**40-45 días** a 24-25 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Lacerta agilis prospera mejor en un terrario exterior o en un recinto a pleno sol, donde el animal recibe luz solar natural, un ritmo diario y anual natural y presas vivas. Una pareja puede mantenerse en un recinto de 2 × 1 m.

TEMPERATURA

Lacerta agilis es un animal amante del sol. La temperatura diurna en el terrario es de 22-30 °C, y el punto de asoleamiento debe tener una temperatura superficial de 38-45 °C, medida con un termómetro infrarrojo.

HUMEDAD Y AGUA

Lacerta agilis procede de hábitats secos y abiertos, y la humedad ambiental en el terrario es del 40-60 %. Una buena ventilación es más importante que la humedad, y el fondo no debe estar constantemente mojado.

ILUMINACIÓN Y UVB

Lacerta agilis toma el sol durante la mayor parte del día y necesita luz intensa y UVB. En exterior, los UVB proceden del sol.

ALIMENTACIÓN

Lacerta agilis es insectívora. En la naturaleza la dieta consiste en escarabajos y sus larvas, saltamontes, grillos, arañas, orugas, cochinillas de la humedad y moscas. Se evitan las hormigas.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Lacerta agilis es una especie solitaria que solo se encuentra con congéneres para aparearse. Los machos son territoriales y ahuyentan a los rivales de los mejores puntos de asoleamiento.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Reino Unido, Francia, Andorra, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Liechtenstein, Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia y China.