herpy

LACÉRTIDOS

Asian Grass Lizard

Takydromus sexlineatus

Takydromus sexlineatus es un lagarto esbelto y diurno, de cola excepcionalmente larga, que vive en hierba alta y vegetación baja del sudeste asiático. Alcanza 20-30 cm, de los cuales la mayor parte es cola, y se alimenta de pequeños insectos. Es una especie tropical que no necesita invernada, pero se deshidrata con rapidez y requiere un terrario alto, con plantación densa y humedad moderada.

Familia: Lacertidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**20-30 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-7 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**34-40 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**60-70 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-4 huevos**
Puestas por año	**2-5**
Incubación	**40 días** a 26 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un terrario de cristal pequeño se queda corto para *Takydromus sexlineatus*, aunque el animal sea pequeño.
TEMPERATURA	El gradiente es lo más importante. La temperatura diurna es de 25-30 °C, y en la zona de asoleo la superficie alcanza 34-40 °C, medida con un termómetro infrarrojo.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser del 60-70 %. Pulveriza el terrario con agua dos veces al día para que los animales puedan beber gotas de las hojas y las paredes y para mantener alta la humedad.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Takydromus sexlineatus* es diurna. El terrario debe tener un pequeño foco de calor y luz UVB.
ALIMENTACIÓN	*Takydromus sexlineatus* es insectívora y come pequeños insectos vivos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Takydromus sexlineatus* es rápida, tímida y un animal para observar.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	India, China, Myanmar (Birmania), Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia y Indonesia.