herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Brazil-nut Poison Frog

Adelphobates castaneoticus

Adelphobates castaneoticus es una rana flecha venenosa pequeña, de un negro brillante y lacado, con manchas blancas o amarillentas y manchas de un naranja intenso en las patas delanteras y las rodillas. Vive en el suelo del bosque, en el estado de Pará, en la Amazonia brasileña, y debe su nombre a la nuez de Brasil, cuyas cáscaras vacías usa el macho como charca para los renacuajos. Se sabe poco sobre su cuidado.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates castaneoticus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**18-23 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-27 °C**
Temperatura, noche	**20-24 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**5-7 meses**
Huevos por puesta	**4-8**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**60-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y otros renacuajos**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Adelphobates castaneoticus*. La especie vive en la hojarasca del suelo del bosque, en un clima de tierras bajas cálido y húmedo.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe estar en 24-27 °C y por la noche baja 3-4 °C, hasta 20-24 °C. La variación a lo largo del año debe ser pequeña, de 1-2 °C. Esto encaja con el clima de tierras bajas de Pará.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad debe rondar el 70-80 % a mediodía y acercarse al 100 % por la mañana y por la noche, y la hojarasca y el sustrato deben estar húmedos en todo momento.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	No hace falta un bebedero, a menos que se quiera obtener descendencia. Las ranas obtienen la humedad de la pulverización y de la hojarasca húmeda.
ILUMINACIÓN Y UVB	Ofrece 10-12 horas de luz al día con tubos fluorescentes o LED para las plantas.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza *A. castaneoticus* se alimenta de hormigas, termitas y otros artrópodos pequeños. En cautividad se alimenta con colémbolos, moscas de la fruta pequeñas e isópodos pequeños.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*A. castaneoticus* es diurna y vive sobre todo en el suelo del bosque.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Brasil.