herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Brilliant-thighed Poison Frog

Allobates femoralis

Allobates femoralis es una rana pequeña y oscura de 3-4 cm procedente de la Amazonia y el Escudo guayanés, con una mancha amarillo anaranjado detrás del brazo y una mancha naranja en forma de media luna en el muslo. Es diurna y terrestre, los machos defienden territorios con un canto fuerte y el cortejo es uno de los más largos entre las ranas flecha. La especie pertenece a la familia Aromobatidae y se considera no venenosa.

Familia: Aromobatidae Nombre anterior: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas	**Ninguna conocida**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-28 °C**
Temperatura, noche	**21-24 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**8-20**
Eclosión	**15-20 días**
Periodo larvario	**40-50 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja de *Allobates femoralis* necesita un terrario de cristal de al menos 60 × 40 × 40 cm. La especie vive a ras de suelo, así que lo que más cuenta es la superficie de la base, aunque los machos trepan un poco para cantar.
TEMPERATURA	Durante el día debe haber 25-28 °C y por la noche 21-24 °C, es decir, 3-4 grados menos. La oscilación diaria se corresponde con las condiciones de la Guayana Francesa y favorece la cría.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser alta: 70-80 % a mediodía y hasta casi el 100 % por la mañana y por la noche.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Pon un cuenco de cristal bajo, de unos 10 cm de diámetro, con 1-2 cm de agua, al que las ranas puedan subir y bajar con facilidad. También lo utiliza el macho para depositar los renacuajos.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es sobre todo para las plantas. Da 12 horas de luz al día, por ejemplo de 7 a 19 h. Los tubos fluorescentes o LED de unos 6.500 K dan colores naturales y buen crecimiento de las plantas.
ALIMENTACIÓN	*Allobates femoralis* se alimenta de pequeños insectos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Allobates femoralis* es diurna y los machos son territoriales.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú y Surinam.