herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Sanguine Poison Frog

Allobates zaparo

Allobates zaparo es una rana pequeña y diurna, de unos 3 cm, de la selva del piedemonte andino de Ecuador y el norte de Perú. Los adultos tienen el dorso rojo, los flancos negros, el vientre azul y manchas amarillas junto a las patas; imitan a las venenosas *Ameerega bilinguis* y *Ameerega parvula*, pero no son venenosos. Se mantiene muy raramente, así que los cuidados se basan en el clima y en la especie emparentada *Allobates femoralis*.

Familia: Aromobatidae Nombre anterior: *Epipedobates zaparo; Phyllobates zaparo; Dendrobates zaparo*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas	**Ninguna conocida**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-27 °C**
Temperatura, noche	**21-23 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**8-20**
Eclosión	**15-20 días**
Periodo larvario	**40-50 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Allobates zaparo*. La especie se mantiene muy raramente y no se ha descrito su cría en cautividad.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 24-27 °C durante el día y a 21-23 °C por la noche. Estas cifras siguen el clima de las tierras bajas de Ecuador en el piedemonte andino. La variación a lo largo del año debe ser pequeña, de 1-2 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 70-80 % a mediodía y cercana al 100 % por la mañana y por la tarde.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Pon un recipiente de cristal bajo con 1-2 cm de agua, del que las ranas puedan salir fácilmente. Los adultos usan el recipiente cuando tienen que depositar los renacuajos.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es sobre todo para las plantas: 10-12 horas al día con iluminación LED de espectro apto para plantas. No está documentado que *Allobates zaparo* necesite UVB.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, las hormigas son una parte importante de la dieta.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Allobates zaparo* es de actividad diurna y vive en la hojarasca. Los machos llaman desde la parte superior de las hojas para atraer a las hembras.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Ecuador y Perú.