herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Pleasing Poison Frog

Ameerega bassleri

Ameerega bassleri es una rana venenosa diurna de poco menos de 4 cm procedente de los bosques húmedos de la falda oriental de los Andes, en el norte de Perú. El macho cuida los huevos y transporta los renacuajos hasta el agua, y la especie debe mantenerse a una temperatura más fresca que la mayoría de las ranas venenosas. Se sabe poco sobre su cuidado y es vulnerable en la naturaleza.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates bassleri; Dendrobates bassleri; Phobobates bassleri*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Madurez sexual	**12-13 meses**
Huevos por puesta	**40**
Eclosión	**10 días**
Periodo larvario	**50-60 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 50 × 55 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**18-21 °C**
Temperatura, noche	**13-17 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Ameerega bassleri*. La especie vive en bosque húmedo junto a arroyos, a 300-1.200 m de altitud, donde el aire es más fresco que en la mayoría de las ranas venenosas.
TEMPERATURA	La especie no debe mantenerse demasiado caliente. De día son adecuados 18-21 °C, y por la noche la temperatura debe bajar 4-6 °C, hasta unos 13-17 °C. La diferencia entre estaciones es de solo 1-2 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 70-100 %. Por la mañana y por la tarde se acerca al 100 % con niebla, mientras que a mediodía puede bajar hasta alrededor del 70 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Debe haber en el terrario un recipiente con 1-2 cm de agua, y para la cría se usa una zona de agua fija o pequeños recipientes para los renacuajos. Usa agua de lluvia o de ósmosis y cámbiala varias veces por semana.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive en el suelo del bosque, donde llega poca luz. Basta con luz LED de espectro apto para plantas y un fotoperiodo de 10-12 horas.
ALIMENTACIÓN	La especie acepta las presas pequeñas habituales: moscas de la fruta, colémbolos, grillos recién nacidos, las larvas más pequeñas de polilla de la cera e insectos pequeños recogidos con manga en el prado.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna y terrestre. El macho es territorial y canta para defender su zona, por lo que los animales necesitan muchos escondites y líneas de visión interrumpidas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú.