herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Ecuador Poison Frog

Ameerega bilinguis

Ameerega bilinguis es una rana dardo venenosa pequeña y diurna, de 17-23 mm, que vive en la hojarasca de la selva tropical del noroeste de la llanura amazónica. El dorso es negro con tubérculos rojos, y el vientre es azul claro con dibujos negros. Es una especie que se mantiene poco y se sabe poco sobre su cuidado.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates bilinguis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**17-23 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**4-16**
Eclosión	**10-22 días**
Periodo larvario	**70-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-26 °C**
Temperatura, noche	**20-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Ameerega bilinguis*, pero la especie se mantiene en pequeños números y se conocen los parámetros básicos del terrario.
TEMPERATURA	La temperatura diurna es de 25-26 °C, y por la noche se reduce 4-5 grados, hasta 20-22 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe acercarse al 100 % por la mañana y por la tarde, preferiblemente con niebla, y puede bajar al 70-80 % a lo largo del día.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Un recipiente de agua poco profundo, con 1-2 cm de agua, permite a las ranas beber y es necesario si se quiere criar, ya que el macho deposita allí los renacuajos.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz debe ante todo proporcionar a las plantas un ciclo de día y noche de unas 12 horas, y para ello basta una lámpara LED para plantas. Los rayos UVB no son necesarios para las ranas dardo venenosas, así que son opcionales.
ALIMENTACIÓN	El alimento consiste en pequeños artrópodos vivos: colémbolos y moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster*), microgrillos, plancton de prado tamizado y pequeños isópodos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna y vive sobre todo en el suelo, aunque los machos suben de buen grado a lugares algo elevados para cantar.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia, Ecuador y Perú.