herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Cainarachi Poison Frog

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi es una rana venenosa de dorso rojo de unos 3 cm que solo se conoce de las estribaciones montañosas alrededor de Tarapoto, en el norte de Perú. La especie está amenazada en la naturaleza y se sabe poco sobre su mantenimiento, por lo que esta guía se basa en el clima, el hábitat y los parientes cercanos *Ameerega bassleri* y *Ameerega pepperi*.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**12-13 meses**
Huevos por puesta	**22-44**
Eclosión	**10 días**
Periodo larvario	**50-60 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-26 °C**
Temperatura, noche	**19-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Ameerega cainarachi*. La especie vive en la misma zona que *Ameerega bassleri* y *Ameerega pepperi*, y los datos de cría se han tomado prestados de ellas (véase Cría).

TEMPERATURA
De día son adecuados 22-26 °C, y por la noche la temperatura debe bajar hasta 5 °C, hasta unos 19-22 °C. La diferencia entre estaciones es de solo 1-2 °C. No hay período de reposo invernal.

HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN
La humedad ambiental debe ser del 70-100 %: alrededor del 70 % a mediodía y cercana al 100 % con niebla por la mañana y por la noche. Pulveriza o usa el sistema de lluvia y el nebulizador un par de veces al día.

AGUA Y CALIDAD DEL AGUA
Basta con un recipiente de agua poco profundo, con 1-2 cm de agua, y debe ser fácil entrar y salir de él. Usa agua de lluvia, de ósmosis o del grifo declorada, y cámbiala cada dos días para que no se acumulen bacterias.

ILUMINACIÓN Y UVB
La luz debe cubrir ante todo las necesidades de las plantas: iluminación LED para el crecimiento vegetal durante 10-12 horas al día, con una noche bien marcada.

ALIMENTACIÓN
Las ranas aceptan las presas pequeñas habituales: moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster* y *Drosophila hydei*), colémbolos, pequeños isópodos, grillos recién nacidos, las larvas de polilla de la cera más pequeñas e insectos pequeños recogidos con manga en el prado.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Ameerega cainarachi es diurna y vive en el suelo de la selva. Los machos del género son territoriales y cantan desde lugares fijos.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
Perú.