herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Yurimaguas Poison Frog

Ameerega hahneli

Ameerega hahneli es una pequeña rana venenosa diurna de 17-22 mm, con franjas laterales claras y vientre azul, que vive en la hojarasca de la selva tropical en gran parte de las tierras bajas amazónicas. El macho transporta los renacuajos hasta agua corriente, y los renacuajos necesitan corriente en el agua. La especie es común en la naturaleza, pero escasa en cautividad.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates hahneli; Dendrobates hahneli*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**17-22 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**6-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**7-12 meses**
Huevos por puesta	**6-33**
Eclosión	**4-16 días**
Periodo larvario	**55-65 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 50 × 50 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**23-25 °C**
Temperatura, noche	**19-21 °C**
Humedad	**65-90 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Solo hay conocimientos limitados sobre el cuidado de *Ameerega hahneli*, y los requisitos pueden variar entre las distintas formas y posibles especies crípticas.
TEMPERATURA	*Ameerega hahneli* necesita 23-25 °C de día y 19-21 °C de noche. Los tubos fluorescentes situados fuera del terrario pueden aportar tanto luz como el calor necesario.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 65-90 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Siempre debe haber un poco de agua accesible, por ejemplo en el canal de drenaje o en un cuenco poco profundo con 1-2 cm de agua. En la época seca no se vacía el canal, para que los animales sigan teniendo acceso al agua.
ILUMINACIÓN Y UVB	La iluminación puede ser de tubos fluorescentes o LED con espectro apto para plantas durante 10-12 horas.
ALIMENTACIÓN	La mosca de la fruta pequeña (*Drosophila melanogaster*) es el alimento principal. Los adultos también toman la mosca de la fruta grande (*Drosophila hydei*), pero a menudo la ignoran porque es algo demasiado grande.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna y terrestre, pero es más activa a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde y al anochecer; el resto del día es más tímida.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam.