Manu Poison Frog

Ameerega macero

Ameerega macero es una pequeña rana venenosa de hábitos diurnos, de 24-30 mm, de las selvas de los alrededores de Manu, en el sureste de Perú y el oeste de Brasil. La cabeza y el dorso son de un rojo vivo, los flancos negros con una franja amarilla, y el vientre azul con un dibujo reticulado negro. La especie se mantiene raramente y se sabe poco sobre su cuidado.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates macero*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**2-3 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**4-16**
Eclosión	**10-22 días**
Periodo larvario	**70-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-28 °C**
Temperatura, noche	**21-25 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Ameerega macero*. La especie se mantiene igual que la similar *Ameerega petersi*, con la que se ha confundido durante mucho tiempo, y los valores de terrario y clima se han tomado de ella.
TEMPERATURA	La temperatura diurna es de 25-28 °C y por la noche baja 3-4 grados, hasta 21-25 °C. Los animales de las zonas más altas de la distribución toleran noches más frescas, y el extremo bajo del intervalo es el más adecuado.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe estar entre el 70 y el 100 %: cerca del 100 % por la mañana y por la tarde, preferiblemente con niebla, y alrededor del 70-80 % a mediodía.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta un bebedero bajo con 1-2 cm de agua. Debe ser tan bajo que un juvenil pueda salir de él, y llevar piedras o musgo en el borde. Cambia el agua con frecuencia y limpia el recipiente con agua caliente sin jabón.
ILUMINACIÓN Y UVB	Ofrece una luz LED con espectro apto para plantas durante 10-12 horas al día. La UVB no es necesaria para las ranas venenosas; una luz UVB débil (zona 1 de Ferguson) es opcional.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, la rana come hormigas, escarabajos y pequeñas larvas de 2-7 mm.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los machos cantan desde el suelo o desde troncos bajos y probablemente defienden pequeños territorios, como hacen sus parientes. En la naturaleza pueden vivir unos diez adultos por 1.000 m² a lo largo de un arroyo.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú y Brasil.