herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Spot-legged Poison Frog

Ameerega picta

Ameerega picta es una rana venenosa pequeña y diurna, de dorso marrón oscuro, flancos negros con franjas claras y manchas de color amarillo a rojo en los muslos. Vive en el suelo del bosque, desde las tierras bajas del Amazonas hasta las estribaciones de los Andes en Bolivia, Perú, Colombia y Brasil, y cuenta con una población aislada en Venezuela. Rara vez se mantiene en cautividad, por lo que los cuidados se basan en el clima de su área de distribución y en parientes cercanos.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates pictus; Dendrobates pictus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**22-28 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**15-40**
Eclosión	**15-22 días**
Periodo larvario	**40-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre los cuidados de *Ameerega picta*. La especie rara vez se mantiene en cautividad y su amplia distribución altitudinal dificulta saber a qué clima está adaptada cada población.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-25 °C durante el día y deja que la temperatura baje 3-4 °C por la noche, hasta 18-22 °C. La oscilación a lo largo del año debe ser pequeña, de 1-2 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 70-80 % a mediodía y cercana al 100 % por la mañana y al atardecer.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Pon un recipiente de agua poco profundo, con 1-2 cm de agua, de modo que las ranas salgan con facilidad, y con piedras o musgo en el borde. Los adultos usan el recipiente cuando tienen que depositar los renacuajos.
ILUMINACIÓN Y UVB	La iluminación es sobre todo para las plantas: 10-12 horas al día con luz LED de espectro apto para plantas. No está documentado que *Ameerega picta* necesite UVB.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza la rana se alimenta de pequeños artrópodos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Ameerega picta* es diurna y vive sobre todo en el suelo. Los machos del género defienden pequeños territorios, así que la pareja es la forma de mantenimiento más segura. No mantengas dos machos juntos en un terrario pequeño.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Bolivia, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela.