herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Silverstone's Poison Frog

Ameerega silverstonei

Ameerega silverstonei es una rana venenosa de color rojo anaranjado, de unos 4 cm, que solo se conoce de la Cordillera Azul, en las laderas orientales de los Andes de Perú. Vive en bosque de montaña fresco a unos 1.300-1.500 m de altitud, está amenazada por la pérdida de hábitat y rara vez se mantiene en cautividad. Su cuidado requiere un terrario fresco.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Epipedobates silverstonei; Dendrobates silverstonei; Phobobates silverstonei*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**4-5 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**15-16 meses**
Huevos por puesta	**30-45**
Eclosión	**30 días**
Periodo larvario	**55-60 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 50 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**20-24 °C**
Temperatura, noche	**17-20 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Ameerega silverstonei*. Se basa en el clima del bosque de montaña a unos 1.300-1.500 m: fresco, húmedo y estable durante todo el año.
TEMPERATURA	De día debe haber 20-24 °C, preferiblemente en el extremo fresco, y de noche 17-20 °C. La temperatura no debe superar los 25 °C. El aire fresco no es un problema mientras las oscilaciones sean pequeñas.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 70-100 %: alrededor del 70 % a mediodía y hasta casi el 100 % por la mañana y al atardecer.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un recipiente de agua bajo con 1-2 cm de agua. Usa agua de lluvia, de ósmosis o decloradada, y cámbiala con frecuencia. El agua debe estar fresca, igual que el aire.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive en suelo de bosque sombrío, así que la luz debe ser moderada y debe haber sombra. Bastan tubos fluorescentes o LED con espectro apto para plantas durante 10-12 horas al día.
ALIMENTACIÓN	*Ameerega silverstonei* acepta presas de tamaño pequeño a grande: moscas de la fruta grandes (*Drosophila hydei*), grillos recién nacidos, las larvas de polilla de la cera más pequeñas e insectos pequeños capturados con manga en el prado.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es tímida y a menudo se retira bajo la hojarasca o la corteza de alcornoque. Puede mantenerse en grupos, pero los machos son territoriales, así que mantén una pareja o un grupo con más hembras que machos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú.