herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Rana venenosa de tres rayas

Ameerega trivittata

Ameerega trivittata es una rana venenosa grande y diurna, de 4-6 cm, que habita el suelo del bosque amazónico. Es negra con dos franjas verde claro a lo largo de los costados, y el macho suele llevar de una sola vez 15-30 renacuajos a la espalda hasta el agua. La rana necesita un terrario más espacioso que las pequeñas ranas venenosas.

Familia: Dendrobatidae Nombre en inglés: Three-striped Poison Frog Nombre anterior: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**4-6 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y humedal**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**12-24 meses**
Huevos por puesta	**15-40**
Eclosión	**15-22 días**
Periodo larvario	**40-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**70 × 50 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**23-25 °C**
Temperatura, noche	**19-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un terrario de al menos 70 × 50 × 50 cm (largo, ancho, alto) es adecuado para dos *Ameerega trivittata* adultas.
TEMPERATURA	La temperatura diurna se mantiene en 23-25 °C y por la noche se reduce 3-4 °C, hasta unos 19-22 °C. La variación a lo largo del año debe ser pequeña, de 1-2 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad debe situarse en 80-90 % la mayor parte del día, cerca del 100 % por la mañana y por la noche, y puede bajar a alrededor del 70 % a mediodía.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un bebedero bajo con 1-2 cm de agua. Debe ser tan bajo que un juvenil pueda salir de él, y con piedras o musgo en el borde.
ILUMINACIÓN Y UVB	No está documentado que el UVB sea necesario para las ranas venenosas en general, y para esta especie concreta no hay información. Una luz UVB débil (zona 1 de Ferguson) es opcional.
ALIMENTACIÓN	La dieta consiste en pequeños artrópodos vivos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los machos cantan con fuerza y defienden pequeños territorios, mientras que las hembras son tranquilas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.