herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Cauca Poison Frog

Andinobates bombetes

Andinobates bombetes es una pequeña rana venenosa diurna de 17-19 mm que habita en los bosques nubosos de los Andes colombianos. Es de color negro a marrón oscuro, con dibujos rojos o naranjas en la parte anterior del cuerpo, y depende de bromelias llenas de agua. La especie es vulnerable en la naturaleza y se sabe poco sobre su cuidado.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya bombetes; Dendrobates bombetes; Minyobates bombetes*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**17-19 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-2**
Eclosión	**16-24 días**
Periodo larvario	**108-112 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 50 × 60 cm** L × An × Al para 5 adultos
Temperatura, día	**22-25 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Andinobates bombetes*. Lo que se expone se basa en el hábitat, un bosque de montaña fresco y muy húmedo con una gruesa capa de hojarasca y bromelias, y en la cría en cautividad en Colombia.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 22-25 °C, y por la noche puede descender hasta 18-21 °C, como en el bosque de montaña. Mantén la temperatura por debajo de 27 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 80-100 % y nunca inferior al 70 %. Pulveriza dos veces al día, por la mañana y por la tarde, o utiliza un sistema de nebulización o de lluvia con agua de ósmosis o agua de lluvia.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	No hace falta un bebedero; las ranas beben gotas de las plantas y del agua pulverizada. Para los renacuajos se usan bromelias con agua en las axilas foliares o pequeños vasos de plástico con 2-3 cm de agua.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es sobre todo para las plantas: una iluminación para plantas de 10-12 horas al día aporta ritmo diurno y crecimiento.
ALIMENTACIÓN	El alimento son pequeños artrópodos: colémbolos, pequeñas moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster*), pequeños isópodos y grillos recién nacidos. Los juveniles recién metamorfoseados solo aceptan colémbolos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Andinobates bombetes* es diurna y se mantiene en la parte baja del terrario, en la hojarasca y junto a las bromelias. Los machos cantan sobre todo por la mañana.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.