herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Bocas Poison Frog

Andinobates claudiae

Andinobates claudiae fue descrita como la rana venenosa más pequeña: los adultos miden solo unos 13 mm. Vive en la hojarasca del bosque de tierras bajas de Bocas del Toro, en el noroeste de Panamá, tanto en las islas como en tierra firme. La especie está amenazada y casi no se sabe nada sobre su mantenimiento.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya claudiae*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Experto**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-25 °C**
Temperatura, noche	**19-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-8**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Casi no se sabe nada sobre el mantenimiento de *Andinobates claudiae*. Las pautas se basan en su hábitat: bosque cálido y húmedo de tierras bajas, con lluvia casi todo el año y una gruesa capa de hojarasca.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 22-25 °C y la nocturna de 19-22 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad debe ser del 80-100 %. Pulveriza el terrario 1-2 veces al día con agua de lluvia o de ósmosis, de modo que la hojarasca se mantenga húmeda, o usa un sistema de lluvia con temporizador.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Las ranas adultas no necesitan bebedero; absorben agua por la piel a partir de la pulverización y de la hojarasca húmeda.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y vive a la sombra en el suelo del bosque. Basta con iluminación LED durante unas 12 horas al día para las plantas.
ALIMENTACIÓN	*Andinobates claudiae* es tan pequeña que las presas deben ser las más pequeñas que existen: colémbolos, pequeñas moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*) y pequeños isópodos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna y se mantiene en la hojarasca y en los refugios. Los machos cantan desde lugares fijos y defienden su territorio, por lo que la forma de mantenimiento es en pareja.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Panamá.