Samaná Poison Frog

Andinobates daleswansoni

Andinobates daleswansoni es una rana venenosa pequeña y diurna, de 18-20 mm, con la cabeza y la parte delantera del cuerpo de un rojo vivo y la parte trasera marrón. Solo se encuentra en el bosque nuboso de la Cordillera Central, en Caldas (Colombia). La especie está amenazada y apenas se mantiene en cautividad, por lo que los cuidados se basan en el clima frío y húmedo de montaña de su hábitat.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya daleswansoni*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**18-20 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-2**
Eclosión	**16-24 días**
Periodo larvario	**108-152 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**18-22 °C**
Temperatura, noche	**14-17 °C**
Humedad	**85-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre los cuidados de *Andinobates daleswansoni*, y la especie apenas se mantiene en cautividad.
TEMPERATURA	No se ha medido la temperatura en el hábitat de la especie. 18-22 °C de día y 14-17 °C de noche son adecuados para el bosque nuboso a 1.800-2.500 m de altitud.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 85-100 %. Pulveriza a fondo la hojarasca y las plantas una o dos veces al día con agua de lluvia o de ósmosis, o usa un sistema de niebla con temporizador.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La especie no necesita una zona de agua. Los animales obtienen la humedad de la hojarasca, las plantas y la pulverización. Los renacuajos crecen en el agua de las hojas de las bromelias.
ILUMINACIÓN Y UVB	Ofrece 10-12 horas de luz al día con LED para que las plantas prosperen. El sotobosque del bosque nuboso es sombrío, así que la luz no debe ser intensa y los animales deben poder buscar sombra.
ALIMENTACIÓN	*Andinobates daleswansoni* mide solo 18-20 mm y come pequeños artrópodos como colémbolos y pequeñas moscas de la fruta.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna y vive en el suelo, en la hojarasca, donde usa huecos y escondites. La conducta territorial y el canto no están documentados. Una pareja puede mantenerse junta en un terrario de 45 × 45 × 45 cm.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.