herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Blue-bellied Poison Frog

Andinobates minutus

Andinobates minutus es una de las ranas venenosas más pequeñas, de solo 13-16 mm del hocico a la cloaca. Vive en la hojarasca del bosque húmedo de tierras bajas, desde el centro de Panamá hasta la costa pacífica de Colombia, y el macho transporta los renacuajos hasta las bromelias. La especie no se captura para el comercio de animales y apenas se mantiene en cautividad, por lo que se sabe poco sobre su cuidado.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya minuta; Dendrobates minutus; Minyobates minutus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**13-16 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-25 °C**
Temperatura, noche	**19-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-8**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Andinobates minutus*. El cuidado se basa en su hábitat: bosque de tierras bajas cálido y húmedo, con lluvia durante la mayor parte del año y una gruesa capa de hojarasca.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 22-25 °C y la nocturna de 19-22 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 80-100 %. Pulveriza el terrario 1-2 veces al día con agua de lluvia o de ósmosis, de modo que la hojarasca se mantenga húmeda, o utiliza un sistema de lluvia con temporizador.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Las ranas adultas no necesitan un cuenco de agua; absorben agua a través de la piel con la pulverización y la hojarasca húmeda.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y vive en la sombra del suelo del bosque. Una iluminación LED de unas 12 horas al día basta para las plantas.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, *Andinobates minutus* se alimenta de ácaros, hormigas, colémbolos y larvas de insectos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna y se mantiene en la hojarasca y junto a los escondites. Los machos cantan desde lugares fijos y defienden su territorio, por lo que la forma de mantenimiento es en pareja.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia y Panamá.