Andean Poison Frog

Andinobates opisthomelas

Andinobates opisthomelas es una rana venenosa pequeña y diurna, de 15-20 mm, procedente de los Andes de Colombia, donde vive en la hojarasca del bosque húmedo de montaña en Antioquia y Caldas. La especie es vulnerable en la naturaleza y apenas se sabe nada sobre su mantenimiento.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya opisthomelas; Dendrobates opisthomelas; Minyobates opisthomelas*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-20 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 50 × 60 cm** L × An × Al para 5 adultos
Temperatura, día	**22-25 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-2**
Eclosión	**16-24 días**
Periodo larvario	**108-112 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Casi no existe información sobre el mantenimiento de *Andinobates opisthomelas*, y es poco probable que se mantenga en cautividad.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 22-25 °C, y por la noche puede bajar a 18-21 °C, como en el bosque de montaña. Mantén la temperatura por debajo de 27 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 80-100 % y nunca inferior al 70 %. Pulveriza dos veces al día, por la mañana y por la tarde, o usa un sistema de nebulización o de lluvia con agua de ósmosis o agua de lluvia.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	No hace falta un bebedero; las ranas beben gotas de las plantas y del agua pulverizada. Para los renacuajos se usan bromelias con agua en las axilas de las hojas o pequeños vasos de plástico con 2-3 cm de agua.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es sobre todo para las plantas: una iluminación para plantas de 10-12 horas al día aporta ritmo diurno y crecimiento.
ALIMENTACIÓN	El alimento son pequeños artrópodos: colémbolos, moscas de la fruta pequeñas (*Drosophila melanogaster*) e isópodos pequeños. Las crías recién metamorfoseadas solo comen colémbolos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Andinobates opisthomelas* es diurna y vive en el suelo, por lo que se mantiene en la parte baja del terrario, en la hojarasca y junto a las bromelias.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.