herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Andinobates tolimensis

Andinobates tolimensis es una rana dardo venenosa pequeña y diurna, de 17-19 mm, con el dorso marrón y la cabeza de un amarillo-bronce metálico brillante. Solo se conoce de un pequeño fragmento de bosque nublado del norte del Tolima, en Colombia, fue descrita en 2007 y apenas se mantiene en cautividad. Por eso los cuidados se basan en el clima fresco y húmedo de montaña de su hábitat.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya tolimense; Ranitomeya tolimensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**17-19 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**19-23 °C**
Temperatura, noche	**15-19 °C**
Humedad	**85-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-2**
Eclosión	**16-24 días**
Periodo larvario	**108-152 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Andinobates tolimensis*, y la especie apenas se mantiene en cautividad.
TEMPERATURA	Mantén 19-23 °C de día y 15-19 °C de noche, lo que corresponde al bosque nublado a unos 1.800 m de altitud.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 85-100 % durante todo el año, y la hojarasca debe estar constantemente húmeda.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La especie no necesita una zona de agua. El agua se encuentra en las axilas de las bromelias, donde crecen los renacuajos, y debe renovarse con regularidad para que no se enturbie.
ILUMINACIÓN Y UVB	*A. tolimensis* vive en un bosque denso con poca luz a ras de suelo, así que la iluminación es sobre todo para las plantas. Ofrece 10-12 horas de luz al día con LED o tubos fluorescentes y oscuridad por la noche.
ALIMENTACIÓN	El alimento son pequeños artrópodos: los colémbolos más pequeños, moscas de la fruta (*Drosophila*) y pequeños isópodos. Alimenta 3-4 veces por semana y deja siempre presas vivas en el terrario.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	No se ha documentado el comportamiento en cautividad. La rana vive en el suelo del bosque, a la sombra, y se esconde en huecos entre las raíces, en la hojarasca y en el musgo. El macho canta desde el suelo.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.