Santander Poison Frog

Andinobates virolinensis

Andinobates virolinensis es una rana dardo venenosa pequeña y diurna, de hasta 19 mm, con la cabeza y la parte anterior del cuerpo de color rojo escarlata y la parte posterior marrón. Solo se encuentra en el bosque nublado de la cordillera Oriental de los Andes, en Colombia. La especie es vulnerable en la naturaleza y apenas se mantiene en cautividad, por lo que los cuidados se basan en el clima fresco y húmedo de montaña de su hábitat.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya virolinensis; Dendrobates virolinensis; Minyobates virolinensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**19 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**19-23 °C**
Temperatura, noche	**15-19 °C**
Humedad	**85-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**1-2**
Eclosión	**16-24 días**
Periodo larvario	**108-152 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Andinobates virolinensis* y la especie apenas se mantiene en cautividad. Los cuidados se basan en su hábitat: bosque nublado fresco y húmedo con una gruesa capa de hojarasca y bromelias.
TEMPERATURA	La temperatura no se ha medido en el hábitat de la especie. De 19 a 23 °C durante el día y de 15 a 19 °C por la noche son valores adecuados para un bosque nublado a 1.300-2.400 m de altitud.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 85-100 %, con la hojarasca húmeda durante todo el año.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La especie no necesita una zona de agua. El agua está en las axilas de las hojas de las bromelias, donde crecen los renacuajos, y hay que cambiarla con regularidad para que no se enturbie.
ILUMINACIÓN Y UVB	*A. virolinensis* vive en el suelo del bosque, a la sombra, de modo que la luz es sobre todo para las plantas. Da 10-12 horas de luz al día con LED o tubos fluorescentes y oscuridad por la noche.
ALIMENTACIÓN	El alimento son pequeños artrópodos: colémbolos y moscas de la fruta (*Drosophila*) del tamaño más pequeño y pequeños isópodos. Alimenta 3-4 veces por semana y deja siempre presas vivas en el terrario.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	El comportamiento en cautividad no está documentado. En la naturaleza varios adultos comparten la misma bromelia, de modo que la especie probablemente tolera la compañía y puede mantenerse en pareja o en un grupo pequeño.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.