Marbled Poison Frog

Epipedobates boulengeri

Epipedobates boulengeri es una rana venenosa pequeña y diurna, de unos 17-24 mm, con el dorso marrón oscuro y una franja clara continua a lo largo del costado. Vive en la selva húmeda de tierras bajas de la costa del Pacífico, desde el suroeste de Colombia hasta el noroeste de Ecuador. Apenas se mantiene en cautividad y se sabe poco sobre su cuidado.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates boulengeri; Phyllobates boulengeri*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**17-24 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**10-30**
Eclosión	**9-14 días**
Periodo larvario	**42-70 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**22-26 °C**
Temperatura, noche	**19-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Epipedobates boulengeri*, y la especie apenas se mantiene en cautividad.
TEMPERATURA	Mantén 22-26 °C durante el día, con zonas algo más frescas y algo más cálidas en el terrario, y 19-22 °C por la noche. Normalmente se consigue con la temperatura ambiente y la iluminación; las mantas térmicas son innecesarias.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 80-100 %. Pulveriza varias veces al día o usa un sistema de lluvia, por ejemplo tres veces al día durante 20-60 segundos, si es posible complementado con un nebulizador.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Un recipiente de agua plano con 1-2 cm de agua, por ejemplo un platillo bajo o media cáscara de nuez de Brasil, ofrece a las ranas un lugar para beber y bañarse, y sirve de lugar de cría cuando el macho deposita los renacuajos.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es para las plantas: tubos fluorescentes o barras LED durante unas 12 horas al día. Las especies emparentadas prosperan sin UVB, así que es opcional.
ALIMENTACIÓN	Las ranas reciben presas vivas y pequeñas: colémbolos y moscas de la fruta (*Drosophila melanogaster*), y los adultos toman además la *Drosophila hydei*, más grande, y grillos recién nacidos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Las especies del género son diurnas, terrestres y territoriales, y los machos cantan desde lugares fijos. El canto no está descrito con más detalle para *E. boulengeri* en sentido estricto.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia y Ecuador.