herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Rio Santiago Poison Frog

Excidobates captivus

Excidobates captivus es una rana venenosa diminuta y diurna, de 12-17 mm, procedente de la zona fronteriza entre Perú y Ecuador. Es de color negro con manchas rojo anaranjadas dispuestas en filas a lo largo del dorso y manchas amarillas en las extremidades y el vientre, y vive en el suelo de la selva húmeda y del bosque de montaña.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates captivus; Ranitomeya captiva; Adelphobates captivus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**12-17 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-26 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**4-8**
Periodo larvario	**65-75 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Excidobates captivus*. La especie vive en el suelo de bosques de cálidos a templados y constantemente húmedos.
TEMPERATURA	No se ha medido la temperatura en las localidades de la especie. 22-26 °C de día y 18-22 °C de noche se sitúan entre el clima de las tierras bajas y el de los 800-1200 m de altitud.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 80-100 % y el sustrato debe estar húmedo todo el año. Pulveriza con agua de ósmosis o de lluvia una o dos veces al día, o usa un sistema de lluvia o de niebla.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	No es necesario un bebedero, porque las ranas obtienen humedad de la pulverización y de la hojarasca húmeda. El agua de las bromelias y de los botes de carrete se cambia cada semana por agua fresca de ósmosis o de lluvia.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive a la sombra, en el suelo del bosque, así que la luz debe servir ante todo para el crecimiento de las plantas y para un día de 12 horas. La UVB no es necesaria, pero es opcional.
ALIMENTACIÓN	*Excidobates captivus* es tan pequeña que solo puede comer presas muy pequeñas: colémbolos, moscas de la fruta sin alas (*Drosophila melanogaster*) y las cochinillas más pequeñas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna, pero se esconde mucho entre la hojarasca. El macho emite sonidos cortos y estridentes desde lugares ocultos. Se mantiene mejor en pareja, porque varios ejemplares juntos pueden provocar peleas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú y Ecuador.