Marañón Poison Frog

Excidobates mysteriosus

Excidobates mysteriosus es una rana venenosa pequeña y diurna, de unos 3 cm, procedente de la Cordillera del Cóndor, en el norte de Perú. Es negra con puntos blancos, se reproduce en bromelias llenas de agua en bosques montanos antiguos y está amenazada en la naturaleza.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates mysteriosus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**17-20 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Madurez sexual	**10-12 meses**
Huevos por puesta	**4-8**
Periodo larvario	**65-75 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Excidobates mysteriosus*. Los animales viven en bosque montano húmedo, cerca de bromelias y rocas, con días cálidos y noches frescas.
TEMPERATURA	La temperatura en las localidades de la especie no se ha medido. Unos 21-25 °C de día y 17-20 °C de noche se ajustan al clima de las estribaciones.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 80-100 % y el sustrato debe mantenerse húmedo todo el año. Pulveriza con agua de ósmosis o de lluvia una o dos veces al día, o usa un sistema de lluvia o de niebla.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	No hace falta un bebedero, porque las ranas obtienen humedad de la pulverización y de las bromelias llenas de agua. El agua de las bromelias y de las cajitas de carrete se cambia cada semana por agua fresca de ósmosis o de lluvia.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y vive a la sombra, bajo follaje denso, así que la luz debe servir ante todo para el crecimiento de las plantas y un día de 12 horas. La luz UVB no es necesaria, pero es opcional.
ALIMENTACIÓN	*Excidobates mysteriosus* es lo bastante grande para comer moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*), colémbolos y, cuando los animales son adultos, *Drosophila hydei*. En la naturaleza come hormigas y moscas pequeñas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna, y el macho canta fuerte y a menudo desde las plantas y las rocas del terrario. Se mantiene mejor en pareja, porque varios animales juntos pueden pelearse.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú.