herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

## Trinidad Poison Frog

# *Mannophryne trinitatis*

*Mannophryne trinitatis* es una rana pequeña, de color marrón y de hábitos diurnos, de 25-28 mm, que solo se encuentra en Trinidad, donde vive junto a arroyos de aguas claras y lecho pedregoso en bosque húmedo. El macho puede volverse negro como el carbón cuando canta, y la hembra tiene la garganta de un amarillo intenso. Apenas se mantiene en cautividad y se sabe poco sobre sus cuidados.

Familia: Aromobatidae  Nombre anterior: *Phyllobates trinitatis*

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **25-28 mm**<br>longitud hocico-cloaca |
| Esperanza de vida | **5-10 años** |
| Activo | **De día** |
| Modo de vida | **Terrestre** |
| Hábitat | **Selva tropical y humedal** |
| Toxinas cutáneas | **Ninguna conocida** |
| Dificultad | **Avanzado** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **60 × 40 × 45 cm**<br>L × An × Al para 2 adultos |
| Temperatura, día | **23-27 °C** |
| Temperatura, noche | **20-22 °C** |
| Humedad | **80-100 %** |
| Agua | **Zona de agua**<br>profundidad 3-5 cm |
| UVB | **Opcional**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentación | **Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)** |
| Se mantiene | **En pareja** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Desarrollo | **Renacuajos transportados al agua** |
| Lugar de puesta | **En el suelo** |
| Huevos por puesta | **6-13** |
| Eclosión | **21 días** |
| Periodo larvario | **40-50 días**<br>desde la eclosión hasta la metamorfosis |
| Alimentación de las larvas | **Algas/plantas y alimento completo** |
| Cuidado parental | **Vigila los huevos y transporta los renacuajos** |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| EL TERRARIO | Se sabe poco sobre los cuidados de *Mannophryne trinitatis*. |
| TEMPERATURA | La temperatura diurna debe ser de 23-27 °C y la nocturna de 20-22 °C. Las ranas de arroyos de bosque toleran mal el calor, así que mantén la temperatura por debajo de 28 °C. |
| HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN | La humedad ambiental debe ser del 80-100 %. Pulveriza a diario, de modo que las hojas y las piedras estén mojadas. Un sistema de nebulización facilita mantener estable la humedad. |
| AGUA Y CALIDAD DEL AGUA | La especie necesita una zona de agua fija, con agua poco profunda, limpia y preferiblemente con algo de corriente, de 3-5 cm de profundidad, con piedras y hojas. |
| ILUMINACIÓN Y UVB | Probablemente no sea necesario el UVB, pero una dosis baja (zona 1 de Ferguson) es opcional. La luz para plantas durante 10-12 horas mantiene vivos el musgo y los helechos. |
| ALIMENTACIÓN | La especie necesita pequeños artrópodos: moscas de la fruta pequeñas y grandes (*Drosophila melanogaster* y *Drosophila hydei*), colémbolos e isópodos pequeños. |
| COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN | *Mannophryne trinitatis* es diurna y territorial. Las hembras defienden sus posiciones con más frecuencia que los machos, con amenazas, lucha y persecución, y muestran la garganta amarilla como amenaza. |
| ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL | Trinidad y Tobago. |