herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Polkadot Poison Frog

Oophaga arborea

Oophaga arborea es una rana venenosa pequeña, de 20-22 mm, que vive en lo alto de los árboles del bosque montano húmedo del oeste de Panamá. Es negra o parda con manchas amarillas redondas, se reproduce en bromelias a 10-16 m del suelo y sus renacuajos se alimentan únicamente de huevos de la hembra. La especie está en peligro crítico.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates arboreus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**20-22 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Experto**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Huevos por puesta	**4-8**
Eclosión	**14 días**
Periodo larvario	**40-50 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Huevos no fecundados de la hembra**
Cuidado parental	**Vigila los huevos, transporta los renacuajos y alimenta a los renacuajos con huevos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 80 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**20-24 °C**
Temperatura, noche	**15-19 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro crítico (CR)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Casi no se sabe nada sobre el cuidado de *Oophaga arborea*, y la especie es casi desconocida en cautividad.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe situarse en 20-24 °C, y de noche debe bajar al menos 4-5 °C, hasta unos 15-19 °C. Esto corresponde al clima del bosque nuboso, con una temperatura media anual de unos 19 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe situarse en el 70-80 % de día y subir al 100 % de noche.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	No hace falta un bebedero. Las ranas obtienen humedad de la niebla, la lluvia y las bromelias llenas de agua, que también se usan para los renacuajos.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive en lo alto de las copas, donde la luz es más intensa que en el suelo del bosque, pero la niebla la atenúa.
ALIMENTACIÓN	Los adultos reciben moscas de la fruta ápteras pequeñas, colémbolos, grillos microscópicos recién eclosionados y plancton de pradera; las mismas presas se usan para las demás especies del género.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Oophaga arborea* es una rana arborícola diurna que rara vez se ve en el suelo.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Panamá.