herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Granular Poison Frog

Oophaga granulifera

Oophaga granulifera es una pequeña rana venenosa de hábitos diurnos, de 19-22 mm, procedente de la vertiente del Pacífico de Costa Rica y del extremo occidental de Panamá. Su piel es claramente granulosa, el dorso es rojo, naranja o verde oliva, y las patas y el vientre van del azul verdoso al turquesa. La especie vive a lo largo de arroyos sombreados del bosque, y la hembra alimenta a sus renacuajos con huevos no fecundados.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates granuliferus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**19-22 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**6 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**12-18 meses**
Huevos por puesta	**2-5**
Eclosión	**19-20 días**
Periodo larvario	**87-212 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Huevos no fecundados de la hembra**
Cuidado parental	**Vigila los huevos, transporta los renacuajos y alimenta a los renacuajos con huevos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**80 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**17-21 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Oophaga granulifera*, y la especie es rara en el hobby.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe situarse en 21-25 °C, y las ranas están más activas a 20-22 °C. Por la noche la temperatura debe bajar 4-5 °C, hasta unos 17-21 °C. La variación estacional es mínima, de aproximadamente 1-2 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe situarse en 80-90 %, y en 100 % a primera hora de la mañana y al final del día, cuando se pulveriza el terrario.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Un recipiente de agua poco profundo, de 1-2 cm de profundidad, por ejemplo un cuenco bajo enterrado en el sustrato o una zona de agua entre las rocas, proporciona agua de bebida y humedad ambiental.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive en el suelo sombreado del bosque, así que la luz debe cubrir ante todo las necesidades de las plantas.
ALIMENTACIÓN	Los adultos reciben pequeñas moscas de la fruta ápteras, colémbolos, grillos microscópicos recién eclosionados, las larvas de polilla de la cera más pequeñas y plancton de prado.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Oophaga granulifera* es tímida y lleva una vida muy oculta, sobre todo en la estación seca, cuando casi desaparece del todo.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Costa Rica y Panamá.