herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Harlequin Poison Frog

Oophaga histrionica

Oophaga histrionica es una rana venenosa diurna de 3-4 cm de la selva tropical del oeste de Colombia, de color marrón a negro con grandes manchas naranjas. Los renacuajos se alimentan exclusivamente de huevos no fecundados que la hembra deposita para ellos, y eso la convierte en una de las ranas venenosas más difíciles de criar. Está en peligro crítico y su delimitación taxonómica cambió en 2018.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates histrionicus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**9 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Experto**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**12 meses**
Huevos por puesta	**4-20**
Eclosión	**10 días**
Periodo larvario	**90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Huevos no fecundados de la hembra**
Cuidado parental	**Vigila los huevos, transporta los renacuajos y alimenta a los renacuajos con huevos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 50 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-26 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro crítico (CR)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja necesita un terrario de selva tropical de al menos 50 × 50 × 50 cm, y cuanto más grande, mejor. Las especies de *Oophaga* pueden ser territoriales, así que mantén una sola pareja, salvo que el terrario sea muy grande.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe estar en 24-26 °C y por la noche baja 5-6 grados, hasta 18-21 °C. A lo largo del año la temperatura solo necesita variar 1-2 grados y no hay reposo invernal.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe estar en 70-80 % a mediodía y cerca del 100 % por la mañana y por la noche. Lo más fácil es lograrlo con un sistema de lluvia y otro de nebulización con temporizador.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Para los adultos basta un recipiente bajo con aproximadamente 1 cm de agua y una rampa de piedra o musgo. Usa agua de ósmosis, agua de lluvia o agua del grifo declorada, y cámbiala con frecuencia.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es sobre todo para las bromelias y las demás plantas. Ofrece unas 12 horas de luz al día con LED o tubos fluorescentes que no calienten mucho.
ALIMENTACIÓN	*Oophaga histrionica* come pequeños artrópodos, en la naturaleza sobre todo hormigas, termitas, ácaros y pequeños escarabajos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Oophaga histrionica* es diurna. El macho canta desde una posición baja y los machos defienden sus territorios. Por eso, mantén solo una pareja en el terrario. No manipules las ranas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.