herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Lehmann's Poison Frog

Oophaga lehmanni

Oophaga lehmanni es una rana venenosa diurna y poco común, procedente de una pequeña zona del oeste de Colombia, de color negro o marrón oscuro con anchas bandas rojas, naranjas o amarillas. Está en peligro crítico en la naturaleza y en un terrario solo tienen cabida ejemplares criados en cautividad. La especie requiere un cuidador con experiencia: no tolera el calor y los renacuajos se alimentan exclusivamente de huevos no fecundados de la hembra.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates lehmanni*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**4-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-24 °C**
Temperatura, noche	**17-19 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En hojas sobre el agua**
Huevos por puesta	**3-10**
Eclosión	**14-28 días**
Periodo larvario	**60-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Huevos no fecundados de la hembra**
Cuidado parental	**Vigila los huevos, transporta los renacuajos y alimenta a los renacuajos con huevos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro crítico (CR)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja de *O. lehmanni* necesita un terrario de al menos 60 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor, sobre todo para la cría.
TEMPERATURA	*O. lehmanni* procede de selva de montaña fresca y es más sensible al calor que la mayoría de las ranas venenosas. Se encuentra mejor a 22-24 °C durante el día, y no se deben superar los 24-25 °C, ni siquiera por poco tiempo.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe situarse entre el 70 y el 100 %: alta por la mañana y por la noche, con niebla si es posible, hasta alcanzar el 100 %, y algo más baja a mediodía, hasta cerca del 70 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Las ranas no necesitan un bebedero, porque la humedad cubre sus necesidades.
ILUMINACIÓN Y UVB	La rana es diurna y vive a la sombra, bajo el dosel del bosque.
ALIMENTACIÓN	*O. lehmanni* solo come pequeños artrópodos vivos. El alimento principal son las moscas de la fruta ápteras, y la especie es lo bastante grande para tomar también las más grandes *Drosophila hydei*.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*O. lehmanni* es diurna y tranquila, pero los machos son territoriales y cantan desde lugares fijos. Mantén la especie en parejas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.