herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Little Devil Poison Frog

Oophaga sylvatica

Oophaga sylvatica es una de las ranas venenosas más grandes del género *Oophaga*: una rana diurna del suelo del bosque, de 3-4 cm, procedente de las selvas de Ecuador y Colombia, conocida por sus numerosas variantes de color naranja, rojo y amarillo sobre fondo negro o marrón, y por su constante cuidado de la prole.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates sylvaticus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**18-24 meses**
Huevos por puesta	**4-20**
Eclosión	**10-16 días**
Periodo larvario	**75-90 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Huevos no fecundados de la hembra**
Cuidado parental	**Vigila los huevos, transporta los renacuajos y alimenta a los renacuajos con huevos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**23-26 °C**
Temperatura, noche	**21-23 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un terrario de al menos 60 × 60 × 60 cm (largo, ancho, alto) es adecuado para una pareja. Los machos son muy territoriales, y también las hembras defienden un territorio y forman jerarquías cuando hay muchos animales.
TEMPERATURA	*Oophaga sylvatica* procede de unas tierras bajas con calor casi constante, por lo que la temperatura debe mantenerse estable: 23-26 °C de día y 21-23 °C de noche.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire se mantiene en un 70-80 % durante el día y sube hasta casi el 100 % temprano por la mañana y tarde por la noche, como cuando la niebla y la lluvia entran en el bosque.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Un recipiente de agua poco profundo con 1-2 cm de agua y una rampa de piedras o musgo basta para los adultos; las ranas son malas nadadoras, y el agua debe llegar como máximo a unas tres cuartas partes de la altura del animal cuando está de pie.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz debe ajustarse sobre todo a las plantas. Los tubos fluorescentes o la luz LED de unos 6.500 K dan colores naturales y buen crecimiento vegetal; elige fuentes de luz de alto rendimiento con reflector.
ALIMENTACIÓN	Los adultos aceptan las presas pequeñas habituales: colémbolos, moscas de la fruta pequeñas y grandes, microgrillos, pequeñas larvas de polilla de la cera, piojos de los libros, pececillos de plata y plancton de prado finamente tamizado.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los machos son muy territoriales y cantan de la mañana a la noche; el canto es corto y agudo, de unos cinco sonidos por segundo. Los machos rivales cantan a porfía, avanzan y retroceden y pueden acabar en peleas de lucha.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Ecuador y Colombia.