herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Vicente's Poison Frog

Oophaga vicentei

Oophaga vicentei es una rana venenosa pequeña, de colores intensos y de hábitos diurnos, que alcanza hasta 24 mm y solo vive en el centro de Panamá. Los colores varían del amarillo y el rojo al azul, el gris y el verde, a menudo con un dibujo reticulado negro. La especie está amenazada en la naturaleza y se sabe poco sobre su mantenimiento.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates vicentei*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**12-24 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Huevos por puesta	**1-12**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**42-56 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Huevos no fecundados de la hembra**
Cuidado parental	**Vigila los huevos, transporta los renacuajos y alimenta a los renacuajos con huevos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-26 °C**
Temperatura, noche	**19-21 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Oophaga vicentei*.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 22-26 °C y la nocturna de 19-21 °C. Las ranas toleran mal el calor, así que evita periodos largos por encima de 28 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe ser del 80-100 % y nunca inferior al 70 %. Pulveriza el terrario a fondo una o dos veces al día con agua sin cal ni cloro (agua de lluvia o de ósmosis), de modo que las hojas y las bromelias queden mojadas.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un recipiente plano con 1-2 cm de agua, porque las ranas nadan mal. Mantenlo limpio y cambia el agua todos los días o cada dos días.
ILUMINACIÓN Y UVB	Probablemente no se necesita UVB, pero un poco de UVB (zona 1 de Ferguson) no hace daño y es opcional. Una iluminación para plantas de 10-12 horas al día mantiene vivas las plantas, y la noche debe ser oscura.
ALIMENTACIÓN	La especie necesita presas muy pequeñas. La base de la dieta son moscas de la fruta pequeñas sin alas (*Drosophila melanogaster*) y colémbolos, complementados con pulgones, termitas pequeñas e isópodos pequeños.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Oophaga vicentei* es diurna. El macho llama desde un lugar elevado y localiza el sitio de cría. Las hembras pueden comerse los huevos de otras hembras, así que una pareja es lo más seguro.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Panamá.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/ranas-flecha/oophaga-vicentei