Kokoe Poison Frog

Phyllobates aurotaenia

Phyllobates aurotaenia es una rana dardo venenosa diurna de 3-4 cm de la costa pacífica de Colombia, de color negro con dos franjas de verdes a doradas a lo largo del dorso. Los ejemplares salvajes llevan en la piel un veneno mortal, pero los criados en cautividad no son venenosos. La especie es atrevida, canta con fuerza y es fácil de reproducir.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates aurotaenia*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Fuertes**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**8-10 meses**
Huevos por puesta	**8-28**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**21-24 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja o un pequeño grupo de *Phyllobates aurotaenia* necesita un terrario de selva tropical de al menos 60 × 45 × 45 cm para hasta 4 adultos.
TEMPERATURA	*Phyllobates aurotaenia* prospera mejor en ambientes frescos. Durante el día debe haber 21-24 °C, y por la noche la temperatura baja a 18-21 °C. La temperatura no debe superar los 27 °C, porque el género tolera mal el calor.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe estar en 70-100 %. La especie tolera brevemente hasta un 50 % si tiene acceso a agua, pero una humedad baja sin agua puede resultar mortal en poco tiempo.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un bebedero poco profundo con 1-2 cm de agua y una piedra o un borde inclinado para que las ranas salgan con facilidad.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es sobre todo para las plantas. Los tubos fluorescentes o la luz LED de unos 6.500 K dan colores naturales y buen crecimiento de las plantas, y unas 12 horas de luz al día es lo habitual.
ALIMENTACIÓN	*Phyllobates aurotaenia* come pequeños artrópodos. Las crías toman *Drosophila melanogaster* ápteras, mientras que los adultos comen con gusto presas mayores como *Drosophila hydei* y grillos muy pequeños.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Phyllobates aurotaenia* es diurna y atrevida, aunque tímida de joven.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.