herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Lovely Poison Frog

Phyllobates lugubris

Phyllobates lugubris es una rana dardo venenosa pequeña y negra, de 19-24 mm, con dos franjas amarillas, doradas o naranjas a lo largo del dorso. Vive en el suelo de la selva húmeda de tierras bajas de la vertiente caribeña de Centroamérica, desde Nicaragua hasta Panamá. De vez en cuando aparece en el comercio, pero se sabe poco sobre su mantenimiento.

Familia: Dendrobatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**19-24 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**7-21**
Periodo larvario	**45-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-3 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Phyllobates lugubris*.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 21-25 °C y la nocturna de 18-21 °C, como para *Phyllobates vittatus*.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser del 80-100 % y la tierra y la hojarasca deben estar siempre húmedas.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Las ranas adultas no beben, sino que absorben agua a través de la piel, y basta con un recipiente poco profundo con 1-3 cm de agua.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive en el suelo del bosque, donde la luz es tenue, y no está documentado que el UVB sea necesario. Una lámpara UVB débil en la zona 1 de Ferguson es opcional; en ese caso, ofrece siempre sombra.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza, *Phyllobates lugubris* come sobre todo hormigas y ácaros.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es diurna y vive oculta entre la hojarasca y las plantas. Los machos cantan desde lugares ocultos y defienden su territorio frente a otros machos, así que varios machos en el mismo terrario pueden causar estrés.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Nicaragua, Costa Rica y Panamá.