herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Rana dardo dorada

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis es la mayor de las ranas dardo venenosas, con 4-5 cm, y en la naturaleza uno de los animales más venenosos que se conocen. Vive solo en un pequeño tramo de selva tropical de la costa pacífica de Colombia. Los ejemplares criados en cautividad son prácticamente inofensivos, atrevidos y siempre visibles, y la especie se ha convertido en una de las ranas dardo venenosas más mantenidas en terrariofilia.

Familia: Dendrobatidae Nombre en inglés: Golden Poison Frog

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**4-5 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Fuertes**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**16-20 meses**
Huevos por puesta	**10-30**
Eclosión	**10-25 días** a 22-24 °C
Periodo larvario	**30-60 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 50 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja de *Phyllobates terribilis* necesita un terrario de al menos 60 × 50 × 50 cm. Un grupo de 4-6 animales necesita al menos 90 × 50 × 50 cm, y más animales requieren más superficie de suelo.
TEMPERATURA	Durante el día debe haber 21-25 °C, preferiblemente un par de grados más en la parte alta del terrario, y por la noche 18-21 °C, que corresponde a la temperatura ambiente de una vivienda.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe ser alta, 70-100 %, pero el fondo no debe encharcarse. Un sistema de lluvia es lo más sencillo, por ejemplo con tres pulverizaciones al día de 20-60 segundos, según las boquillas.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Ofrece uno o varios pequeños recipientes de agua con unos 2 cm de agua, por ejemplo platillos o mitades de cáscara de nuez de Brasil, de los que los animales puedan salir fácilmente.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es sobre todo para las plantas. Bastan tubos fluorescentes o barras LED durante unas 12 horas al día, y la duración del día puede variar un poco a lo largo del año.
ALIMENTACIÓN	*Phyllobates terribilis* toma presas mayores que la mayoría de las ranas dardo venenosas. En la naturaleza, las hormigas son el alimento principal, pero come muchos tipos de pequeños artrópodos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Phyllobates terribilis* es diurna, atrevida y curiosa, y está visible la mayor parte del día, con una breve pausa a mediodía. Los machos cantan con un trino suave, parecido al de un pájaro, sobre todo tras la pulverización.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia.