herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Golfodulcean Poison Frog

Phyllobates vittatus

Phyllobates vittatus es una rana venenosa negra con dos franjas claras de color naranja o amarillo a lo largo del dorso y patas con marmoreado azul. Vive únicamente en el bosque de tierras bajas alrededor del Golfo Dulce, en el suroeste de Costa Rica. En el terrario es diurna, de canto frecuente y muy reproductora, y el macho transporta él mismo los renacuajos al agua.

Familia: Dendrobatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**8-10 meses**
Huevos por puesta	**7-21**
Periodo larvario	**45-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 4 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Hasta cuatro ejemplares de *Phyllobates vittatus* necesitan un terrario de al menos 60 × 45 × 45 cm.
TEMPERATURA	De día *Phyllobates vittatus* necesita 21-25 °C y de noche 18-21 °C, algo que la mayoría de los salones cumplen.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe situarse entre el 70 y el 100 %. La especie tolera hasta un 50 % durante periodos cortos si tiene acceso a agua, pero una humedad baja sin agua puede resultar mortal rápidamente.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Ofrece un recipiente de agua bajo o una pequeña zona de agua con 1-2 cm de agua y una piedra o un trozo de corteza para que los animales puedan salir con facilidad.
ILUMINACIÓN Y UVB	La luz es para las plantas. Basta con barras LED o tubos fluorescentes con temporizador durante 10-12 horas al día, y la noche debe ser oscura. Ofrece sombra y nunca coloques el terrario bajo el sol directo.
ALIMENTACIÓN	*Phyllobates vittatus* es poco habitual porque los adultos aceptan presas más grandes que la mayoría de las ranas venenosas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Phyllobates vittatus* es diurna, y los machos tienen un canto agudo y trinado. La especie puede mantenerse en pareja o en grupo.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Costa Rica.