Rana venenosa amazónica

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica es una rana dardo venenosa diminuta y diurna, de 16-19 mm, procedente de la Amazonia de los alrededores de Iquitos (Perú) y Leticia (Colombia). Es negra con franjas rojas, naranjas o amarillas y un jaspeado gris azulado en las patas, se reproduce en bromelias y se considera una de las pequeñas Ranitomeya más fáciles de mantener y reproducir.

Familia: Dendrobatidae Nombre en inglés: Amazonian Poison Frog Nombre anterior: *Dendrobates amazonicus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**16-19 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Madurez sexual	**5-8 meses**
Huevos por puesta	**2-8**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo y otros renacuajos**
Cuidado parental	**Transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**21-26 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja o un trío de *Ranitomeya amazonica* necesita un terrario de al menos 40 × 40 × 40 cm. Si va a haber más ranas, calcula unos 20 litros adicionales por animal y elige mejor un terrario alto que uno bajo.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-26 °C de día y a 18-21 °C de noche. Las ranas son más activas y se reproducen mejor en el extremo cálido, a 24-26 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe situarse en 70-100 %, preferiblemente 80-100 %.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	*Ranitomeya amazonica* nada mal, así que el agua debe ser poco profunda y fácil de salir.
ILUMINACIÓN Y UVB	Las ranas son diurnas y viven en la sombra del bosque. La luz es ante todo para las plantas: ofrece 12-14 horas de luz LED para plantas al día.
ALIMENTACIÓN	*Ranitomeya amazonica* es tan pequeña que solo puede comer presas diminutas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Ranitomeya amazonica* es diurna, pero a menudo tímida, y sobre todo los ejemplares jóvenes se esconden mucho. En un terrario con mucha vegetación y muchas hojas secas, las ranas se dejan ver más.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú y Colombia.