herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Blessed Poison Frog

Ranitomeya benedicta

Ranitomeya benedicta es una rana flecha venenosa pequeña, de hábitos diurnos y de 16-20 mm, procedente del bosque de tierras bajas del norte de Perú. La cabeza de un rojo intenso y el cuerpo negro con un dibujo reticulado azul la convierten en una de las más coloridas del género. Hasta 2008 se consideraba una subespecie de *Ranitomeya fantastica*. En la naturaleza es vulnerable, pero los animales criados en cautividad se reproducen con facilidad en un terrario bien montado.

Familia: Dendrobatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**16-20 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-26 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**2-6**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**60-114 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja de *R. benedicta* puede mantenerse en un terrario de 40 × 40 × 40 cm.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-26 °C durante el día y a 18-22 °C por la noche. La especie se encuentra mejor en torno a 21-24 °C, y la temperatura no debe superar los 27 °C durante periodos prolongados.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe situarse entre el 70 y el 100 %. Un buen ritmo es casi el 100 % por la mañana y por la noche y el 70-75 % a mediodía, de modo que el terrario se seque un poco entre pulverizaciones.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un cuenco de agua poco profundo o una bromelia con agua en las axilas de las hojas.
ILUMINACIÓN Y UVB	*R. benedicta* es diurna, y la luz está pensada ante todo para las plantas. Ofrece 12-14 horas de luz al día con tubos fluorescentes o LED con temporizador, durante todo el año, y oscuridad por la noche.
ALIMENTACIÓN	La base de la alimentación son pequeños artrópodos vivos. Los animales de todas las edades toman moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*), y los adultos también pueden tomar la más grande *D. hydei*.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*R. benedicta* es diurna y puede ser algo tímida, sobre todo de joven, pero en un terrario densamente plantado y con escondites los adultos se ven mucho. El macho canta a la vista.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú.