herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Red-headed Poison Frog

Ranitomeya fantastica

Ranitomeya fantastica es una rana dardo venenosa diurna de 20-25 mm del norte de Perú y una de las más grandes del género. Es muy variable, y muchas formas tienen la cabeza de un naranja, rojo o amarillo intenso sobre un cuerpo negro con dibujos claros. Las ranas son rapidísimas y a menudo tímidas, las puestas son difíciles de encontrar y la especie se adapta mejor a un cuidador que ya tenga experiencia con ranas dardo venenosas.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Dendrobates fantasticus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**20-25 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**21-26 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**3-8**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja o un trío de *R. fantastica* puede mantenerse en un terrario de 40 × 40 × 40 cm. Cuanto más grande, mejor. Muchas formas son arborícolas y aprovechan la altura.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-26 °C de día y a 18-22 °C de noche. La temperatura no debe superar los 27 °C durante mucho tiempo, y por encima de 29 °C puede ser mortal. El calor es más peligroso que el frío.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad debe estar entre el 70 y el 100 %. Un buen ritmo es casi el 100 % por la mañana y por la tarde y un 70-75 % a mediodía, de modo que el terrario se seque un poco entre pulverizaciones.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta un recipiente de agua bajo o una bromelia con agua en las axilas de las hojas.
ILUMINACIÓN Y UVB	*R. fantastica* es diurna, y la luz es ante todo para las plantas. Ofrece 12-14 horas de luz al día y oscuridad por la noche. No está documentado que la especie necesite UVB.
ALIMENTACIÓN	La base de la alimentación son pequeños artrópodos. Juveniles y adultos aceptan moscas de la fruta sin alas (*Drosophila melanogaster*), y los adultos grandes también pueden tomar la más grande *D. hydei*.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*R. fantastica* es diurna, rapidísima y a menudo tímida, pero muchos animales se vuelven más atrevidos cuando crían. Se ven sobre todo en un terrario densamente plantado con escondites.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú.