Rana venenosa imitadora

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator es una pequeña rana dardo venenosa de hábitos diurnos, de 16-20 mm, procedente del norte de Perú. Cada forma local imita a otra rana venenosa de la misma zona, y la especie fue el primer anfibio en el que se demostró una monogamia real: la pareja cuida junta de las crías y la hembra alimenta a cada renacuajo con huevos no fecundados.

Familia: Dendrobatidae Nombre en inglés: Mimic Poison Frog Nombre anterior: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**16-20 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Madurez sexual	**5-8 meses**
Huevos por puesta	**1-8**
Eclosión	**7-16 días**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Alimento completo y huevos no fecundados de la hembra**
Cuidado parental	**Vigila los huevos, transporta los renacuajos y alimenta a los renacuajos con huevos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**21-26 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja de *R. imitator* necesita un terrario de al menos 45 × 45 × 45 cm. A las ranas les gusta trepar, así que aprovecha la altura.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-26 °C de día y a 18-22 °C de noche. La especie se encuentra mejor en torno a 21-24 °C.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental debe estar entre el 70 y el 100 %. Procura alcanzar casi el 100 % por la mañana y por la tarde y un 70-75 % a mediodía, para que el terrario se seque un poco entre pulverizaciones.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un bebedero poco profundo o una bromelia con agua en las axilas de las hojas.
ILUMINACIÓN Y UVB	*R. imitator* es diurna y vive a la sombra bajo el dosel del bosque. La luz es sobre todo para las plantas. Da luz LED 12-14 horas al día, por ejemplo de 8 a 20 h.
ALIMENTACIÓN	El alimento base son pequeños artrópodos: moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*), colémbolos y pequeñas cochinillas. Los adultos grandes también pueden tomar la *D. hydei*, más grande.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*R. imitator* es atrevida y diurna, y a menudo se ve a la vista en el terrario. El macho llama desde lugares fijos y ambos sexos defienden el territorio de la pareja frente a congéneres.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú.