herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

## Red-backed Poison Frog

# *Ranitomeya reticulata*

*Ranitomeya reticulata* es una de las ranas venenosas más pequeñas: mide solo 13-17 mm, con el dorso de color rojo cobrizo a naranja y las patas gris azuladas con un dibujo reticulado negro. Vive en el bosque de tierras bajas de la Amazonía, en el noreste de Perú y el este de Ecuador. En el terrario es atrevida y activa, pero exigente, porque los huevos son difíciles de encontrar y los juveniles cuesta mucho sacarlos adelante.

Familia: Dendrobatidae  Nombre anterior: *Dendrobates reticulatus*

### DATOS CLAVE

#### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **13-17 mm**<br>longitud hocico-cloaca |
| Esperanza de vida | **5-10 años** |
| Activo | **De día** |
| Modo de vida | **Arborícola y terrestre** |
| Hábitat | **Selva tropical** |
| Toxinas cutáneas en la naturaleza | **Leves** |
| Toxinas cutáneas en cautividad | **Ninguna**<br>Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo |
| Dificultad | **Avanzado** |

#### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **30 × 30 × 45 cm**<br>L × An × Al para 2 adultos |
| Temperatura, día | **22-26 °C** |
| Temperatura, noche | **18-22 °C** |
| Humedad | **70-100 %** |
| Agua | **Bebedero**<br>profundidad 1-2 cm |
| UVB | **Opcional** |
| Alimentación | **Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)** |
| Se mantiene | **En pareja** |

#### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Desarrollo | **Renacuajos transportados al agua** |
| Lugar de puesta | **En el suelo** |
| Huevos por puesta | **1-8** |
| Eclosión | **10-14 días** |
| Periodo larvario | **60-80 días**<br>desde la eclosión hasta la metamorfosis |
| Alimentación de las larvas | **Algas/plantas y alimento completo** |
| Cuidado parental | **Transporta los renacuajos** |

#### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **Apéndice II** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | Una pareja de *R. reticulata* necesita un terrario de al menos 30 × 30 × 45 cm, preferiblemente de 40 × 40 × 45 cm o más grande. A las ranas les gusta trepar, así que conviene aprovechar la altura. |
| **TEMPERATURA** | Mantén el terrario a 22-26 °C de día y a 18-22 °C de noche. La temperatura no debe superar los 27 °C durante largos periodos, y por encima de 29 °C puede ser mortal. El calor es siempre más peligroso que el frío. |
| **HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN** | La humedad del aire debe situarse en el 70-100 %. Un buen ritmo es casi el 100 % por la mañana y por la tarde y un 70-75 % a mediodía, de modo que el terrario se seque un poco entre pulverizaciones. |
| **AGUA Y CALIDAD DEL AGUA** | Basta con un recipiente de agua poco profundo o una bromelia con agua en las axilas de las hojas. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | *R. reticulata* es diurna y la iluminación es ante todo para las plantas. Ofrece 12-14 horas de luz al día, por ejemplo LED de las 8 a las 20 h, y oscuridad por la noche. No está documentado que la especie necesite UVB. |
| **ALIMENTACIÓN** | La base de la alimentación son pequeños artrópodos. Los juveniles y la mayoría de los adultos aceptan moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*), y los adultos grandes también pueden tomar la mayor *D. hydei*. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | *R. reticulata* es rapidísima y atrevida y suele verse a la vista, como si no supiera lo pequeña que es. Los machos llaman desde lugares fijos con un zumbido agudo y corto. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Perú y Ecuador. |