herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Sira Poison Frog

Ranitomeya sirensis

Ranitomeya sirensis es una rana venenosa pequeña y diurna, de 15-25 mm, del este de Perú, el norte de Bolivia y el extremo occidental de Brasil. La especie incluye las formas que antes se vendían como "lamasi" y "biolat", y la mayoría de ellas están entre las ranas venenosas más fáciles de reproducir. Las ranas prosperan en grupos cuando hay espacio suficiente.

Familia: Dendrobatidae Nombre anterior: *Ranitomeya lamasi; Dendrobates lamasi; Dendrobates sirensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-25 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En las axilas de las hojas (p. ej., bromelias)**
Madurez sexual	**5-8 meses**
Huevos por puesta	**1-8**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**58-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**21-25 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**80-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja o un trío de *R. sirensis* necesita un terrario de al menos 45 × 45 × 45 cm.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-25 °C de día y a 18-21 °C de noche. La temperatura no debe superar los 27 °C durante periodos prolongados, y por encima de 29 °C es peligrosa.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire debe estar entre el 80 y el 100 %. La especie solo tolera brevemente hasta el 50 %, y solo si tiene acceso a agua; una humedad baja sin agua puede resultar mortal rápidamente.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta con un cuenco de agua bajo o una bromelia con agua en las axilas de las hojas.
ILUMINACIÓN Y UVB	*R. sirensis* es diurna y la luz es sobre todo para las plantas. Ofrece 12-14 horas de luz al día con tubos fluorescentes o LED y oscuridad por la noche. No está documentado que la especie necesite UVB.
ALIMENTACIÓN	El alimento base son pequeños artrópodos: moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*), colémbolos y pequeñas cochinillas. Los adultos también aceptan la *D. hydei*, más grande, y grillos recién eclosionados.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*R. sirensis* suele ser tímida y se esconde de buen grado, así que un terrario densamente plantado con muchos escondites es el que ofrece más que ver. El macho canta para atraer a una hembra a un lugar de puesta.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Bolivia, Brasil y Perú.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/ranas-flecha/ranitomeya-sirensis