herpy

RANAS DARDO VENENOSAS

Summers' Poison Dart Frog

Ranitomeya summersi

Ranitomeya summersi es una rana flecha venenosa pequeña y diurna, de 16-21 mm, originaria del valle del Huallaga, en Perú. Es de color naranja o cobrizo con un marmoreado negro y una máscara negra sobre los ojos. La especie está amenazada en la naturaleza, sus huevos son difíciles de encontrar y las ranas son rápidas y esquivas, por lo que resulta más adecuada para un cuidador con experiencia en ranas flecha venenosas.

Familia: Dendrobatidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**16-21 mm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas en la naturaleza	**Leves**
Toxinas cutáneas en cautividad	**Ninguna** Animales criados en cautividad. Los animales capturados en la naturaleza pueden conservar sus toxinas durante mucho tiempo
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 45 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**21-26 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-100 %**
Agua	**Bebedero** profundidad 1-2 cm
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Renacuajos transportados al agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por puesta	**4-9**
Eclosión	**10-14 días**
Periodo larvario	**60-80 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Algas/plantas y alimento completo**
Cuidado parental	**Vigila los huevos y transporta los renacuajos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja o un pequeño trío de *R. summersi* puede mantenerse en un terrario de al menos 30 × 30 × 45 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 21-26 °C durante el día y a 18-21 °C por la noche. La temperatura no debe superar los 27 °C durante mucho tiempo, y por encima de 29 °C es mortal. La especie tolera peor el calor que el frío.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad debe situarse en 70-100 %. Un buen ritmo es cerca del 100 % por la mañana y por la noche y 70-75 % a mediodía, de modo que el terrario pueda secarse un poco entre las pulverizaciones.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Basta un recipiente bajo con agua o una bromelia con agua en las axilas de las hojas.
ILUMINACIÓN Y UVB	*R. summersi* es diurna y la luz sirve sobre todo para las plantas. Ofrece 12-14 horas de luz al día y oscuridad por la noche. No está documentado que la especie necesite UVB.
ALIMENTACIÓN	La base de la alimentación son pequeños artrópodos vivos. Las crías y los juveniles toman moscas de la fruta ápteras (*Drosophila melanogaster*), y los adultos grandes también pueden tomar la más grande *D. hydei*.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*R. summersi* es diurna, rápida y a menudo esquiva, pero puede volverse más atrevida cuando se acostumbra al terrario. Se las ve más en un terrario densamente plantado con escondites.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Perú.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/ranas-flecha/ranitomeya-summersi